

Aumento de mamas

¿Quién es la candidata ideal?

El aumento mamario, técnicamente conocido como mamoplastia de aumento, es un procedimiento quirúrgico que nos permite mejorar el tamaño y la forma del pecho de la mujer en las siguientes situaciones: mujeres cuyos pechos son pequeños, mujeres que han experimentado una disminución de volumen en sus pechos tras embarazos-lactancia o pérdida importante de peso, mujeres con una diferencia de tamaño entre ambas mamas o como un procedimiento reconstructivo tras cirugía oncológica de la mama.



JORDÁN BARRES
CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA

De la forma más natural

C/ Mayor, 100 - 3º - Pta 19 / 12001 CASTELLÓN / T 964 23 55 60 · M 626 71 95 88

drbarres@cirugiaesteticacastellon.com

www.cirugiaesteticacastellon.com



JORDÁN BARRES
CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA

De la forma más natural

Cirugía Estética
por Cirujanos Plásticos

Aumento de mamas

Dr. Jordán Barres Caballer

N.º de Colegiado
4619286



SECPRE
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA PLÁSTICA
REPARADORA Y ESTÉTICA



JORDÁN BARRES
CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA

De la forma más natural



Aumento de mamas

¿Dónde se realiza la cirugía?

La intervención se realiza en un quirófano totalmente equipado y con las máximas garantías, en el Hospital Rey Don Jaime de Castellón o en el Hospital 9 de Octubre de Valencia.

¿Qué tipo de anestesia se emplea?

La cirugía de aumento mamario se realiza bajo anestesia general.

La cirugía

El procedimiento dura entre 1 y 2 horas.

El aumento mamario se realiza a través de una pequeña incisión que se coloca, dependiendo de la anatomía y de las preferencias del paciente, alrededor de la areola, en el surco submamario o en la axila. La incisión se diseña para que la cicatriz resultante sea casi invisible. A través de esta incisión se levanta el tejido mamario, se crea un bolsillo y se coloca la prótesis, directamente debajo del tejido mamario, la fascia o el músculo pectoral mayor. La prótesis que se utiliza en casi todos los casos son de gel cohesivo de silicona y superficie texturizada, siendo la forma redonda o anatómica (en forma de gota), en función de las características individuales de cada paciente.

Después de la cirugía

Suele ser preciso el ingreso hospitalario, dándose el alta al día siguiente.

La mayoría de las molestias se controlan bien con la medicación prescrita, aunque las mamas pueden doler durante la primera semana, sobre todo si el implante se coloca debajo del músculo pectoral. El vendaje o los apósitos serán retirados al día siguiente, así como los drenajes, en caso de ser utilizados, siendo sustituidos por un sujetador especial, que deberá llevar durante 2-3 semanas. Los puntos se retiran entre los 7 y 14 días.

Tras un aumento mamario en pocos días podrá hacer vida normal, aunque deberá limitar la actividad física intensa durante las primeras 2-3 semanas.

¿Existen riesgos? ¿Hay garantías?


Todos los años se realizan cientos de mamoplastias de aumento, una técnica segura, siempre y cuando se seleccione bien al paciente, el quirófano esté bien equipado y sea realizada por un equipo de profesionales cualificado. Sin embargo, siempre que se realiza una cirugía existen riesgos, al igual que complicaciones relacionadas con este procedimiento en concreto, complicaciones que le son explicadas detalladamente en la consulta y que se pueden reducir si se siguen las instrucciones que proporcionamos a los pacientes tanto antes como después de la cirugía.

Los resultados.

Los resultados tras un aumento mamario suelen ser muy gratos para la paciente así como duraderos. Las revisiones periódicas que realizamos y las

mamografías-ecografías asegurarán que si hubiese alguna complicación sea detectada a tiempo y solucionada. La decisión de someterse a un aumento mamario es algo muy personal que no todo el mundo tiene porqué entender; si la paciente está satisfecha, la intervención habrá sido un éxito.


La información contenida en esta página es de carácter informativo y en ningún caso puede, ni pretende, sustituir la información proporcionada de manera individual en la consulta.




Las incisiones pueden colocarse en el surco mamario.



Las incisiones pueden colocarse también en la axila.



Las incisiones pueden colocarse también en el borde inferior de la areola.



Colocación subglandular (izda.) y subpectoral (drcha.) de las prótesis mamarias.